

# O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A VACINA DA HEPATITE!

A contaminação pela hepatite A ocorre pela via fecal-oral, basicamente por meio do contato entre indivíduos ou por meio de água e alimentos contaminados.

De acordo com o Ministério da Saúde, outras formas de transmissão são os contatos pessoais próximos, entre moradores da mesma casa, pessoas em situação de rua ou entre crianças em creches.

A infecção pelo vírus da hepatite A nem sempre causa sintomas. Quando estes ocorrem, os pacientes podem sentir cansaço, mal-estar, tontura, dores no corpo, enjoo, vômitos, febre, dor abdominal, apresentação de pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

A vacina contra a hepatite A é indicada para a prevenção e combate a futuras infecções provocadas pelo vírus A da doença. É uma vacina inativada, portanto não é capaz de causar a doença.

## Saiba +

### INDICAÇÃO

- Crianças a partir dos 12 meses de vida.
- Adultos e idosos não vacinados.

### DOSES

- A vacina deve ser administrada via intramuscular, em duas doses com intervalo de seis meses.

As sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIIm) recomendam a aplicação rotineira aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a vacinação não ocorrer nessas idades recomendadas.

Adultos e idosos não vacinados: esquema de duas doses, com intervalo de seis meses entre as doses.

A dose para crianças é 0,5ml e a dose para adultos é de 1,0ml por dose.

### CONTRAINDICAÇÃO

- Pessoas que tiveram reação anafilática a algum componente da vacina ou a dose anterior.

Em caso de doença aguda com febre alta, a vacinação deve ser adiada até que ocorra a melhora.

### ONDE SE VACINAR?

O Centro de Imunização funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.  
Sábado, das 8h às 12h (sob agendamento).

Reserve sua vacina pelo telefone: (31) 3514-7936 ou (31) 99215-0114.

**Av. do Contorno, nº 9.841 - 3º andar. Barro Preto - Belo Horizonte, MG.**