



# ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA CORONARIANA

- **Cateterismo Cardíaco** - exame diagnóstico de estudo das artérias coronarianas, avalia se há obstrução.
- **Angioplastia Coronariana** - procedimento terapêutico para tratar as obstruções coronarianas existentes.

## ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS

- Agendar consulta para avaliação pré-anestésica.
- Realizar os exames solicitados na avaliação pré-operatória e apresentar no dia do procedimento.
- Agendar o procedimento no setor de hemodinâmica, no endereço:

 **Rua Aimorés, 3.600, Barro Preto, BH.**  
 **Telefones: (31) 35147189 ou 35147435**

- Comunicar sobre todos os medicamentos em uso.

## ORIENTAÇÕES RELACIONADAS AO PREPARO PARA O PROCEDIMENTO:

O médico irá avaliar a necessidade de suspensão ou adição de algumas medicações.

Seguem as medicações que **deverão ser suspensas:**

- **Sildenafil (Viagra) ou Tadalafila (Cialis): não tomar nos dois dias** que precedem o exame e nem no dia do exame (com exceção daqueles que estejam fazendo uso por hipertensão pulmonar).
- **Insulina NPH:** usar metade da dose usual no dia do procedimento.
- **ANTICOAGULANTES: Dabigatrana (Pradaxa), Rivaroxabana (Xarelto), Apixabana (Eliquis), Edoxaban (Lixiana):** não tomar no dia que precede o exame e nem no dia do exame.

Em caso do uso de Warfarina (Marevan, Coumadin, Marcoumar), o paciente deverá receber orientações específicas do médico do setor antes do procedimento.

Em caso de alergia comprovada a contraste iodado, esta deverá ser comunicada ao médico da hemodinâmica para realização de preparo anterior ao procedimento.

Seguem as medicações a serem **adicionadas:**


- Para procedimentos terapêuticos como angioplastia e endoprótese, **acrescenta-se** o uso de AAS e clopidogrel, de acordo com a receita emitida pelo médico responsável.
- Os medicamentos AAS (aspirina) e clopidogrel não devem ser suspensos para a realização dos procedimentos.

\*Para mais informações e em caso de dúvidas sobre a suspensão de medicações, verifique com seu médico ou com o setor de hemodinâmica.



## ORIENTAÇÕES PARA O DIA DO PROCEDIMENTO


- No dia do procedimento, o paciente deve tomar as medicações de uso habitual, a não ser aquelas com orientação de suspensão pelo médico.
- Não usar maquiagem, esmalte nas unhas ou adornos (relógios, anéis, pulseiras, etc.).
- São necessárias 8 horas de jejum (o número pode aumentar e diminuir de acordo com a orientação pré-anestésica).
- Em até 3 horas antes do procedimento, podem ser ingeridos 150 ml de líquidos sem resíduos, de cor clara, com pouco açúcar e sem álcool (água, chá, suco de maçã, água de coco sem resíduo, gelatina).
- Para a ingestão dos medicamentos habituais, aqueles que não forem suspensos pelo médico, o paciente pode tomar um pouco de água (até 150 ml). Os medicamentos devem ser ingeridos em até 3 horas antes do procedimento.
- Não tomar leite ou derivados após o horário de início do jejum.
- Trazer todos os exames, que serão avaliados pelo médico.
- Estar com 1 acompanhante maior de 18 anos de idade.
- Dar preferência a roupas confortáveis e fáceis de vestir.



## ORIENTAÇÕES PARA A INTERNAÇÃO

- Chegar às \_\_\_\_\_ horas para o procedimento de internação. Rua Aimorés, 3.600, Barro Preto, BH.
- O horário do exame será confirmado no momento da internação, de acordo com o preparo necessário.
- Trazer os seguintes documentos:
  - Carteira de identidade e CPF;
  - Carteira do convênio;
  - Solicitação médica original;
  - Avaliação pré-anestésica (realizada até 3 meses antes do procedimento)
  - Termo de consentimento assinado. Se não houver, será aplicado no dia do exame.
  - Resultados de exames recentemente realizados: ecocardiograma, ECG, teste ergométrico, urina e sangue (os exames de ureia e creatinina são obrigatórios)
  - Outros:

**O laudo do exame/procedimento será entregue no máximo 03 dias após o procedimento.**



## ORIENTAÇÕES APÓS O PROCEDIMENTO

- **Sala de recuperação:** após o procedimento, o paciente retornará para a sala de observação do setor, onde ficará por pelo menos 1 hora após a sedação ou pelo tempo necessário para a avaliação do curativo. Nesse ambiente, o paciente será assistido pela equipe médica e enfermagem, e receberá todos os cuidados necessários para a recuperação.
- **Alimentação:** a dieta será liberada e oferecida pelo hospital logo após o término da cirurgia, quando o paciente estiver acordado e for avaliado pela equipe médica e de enfermagem.
- **Dor:** habitualmente não haverá dor no local da punção, que é realizada na região do pulso ou inguinal. Em caso de dor, avisar a equipe de enfermagem para providenciar medicamentos que ajudarão no alívio desta. Pode haver dor no peito, nesse caso, acionar a enfermagem para avaliação imediata.
- **Posição no leito:** após o procedimento, a orientação é de manter o membro de punção imóvel por 2 horas (se feita no punho) ou 4 horas (se feita na região inguinal). Essa imobilização ocorre para prevenir sangramentos no local da punção.

Ao levantar da cama, a enfermagem deve ser sempre acionada

Alguns pacientes podem apresentar queda de pressão ao se levantarem da cama, sendo assim, a orientação é aguardar a enfermagem ou médico, para que autorizem a levantar-se do leito. O paciente deve assentar-se na cama ou cadeira um pouco antes de se levantar e caminhar com a enfermagem ou seu acompanhante.



## **Hospital Felício Rocho**

Av. do Contorno 9530, Barro Preto  
Belo Horizonte - MG

(31) 3514-7000 / (31) 3514-7490

---

 [feliciorocho.org.br](http://feliciorocho.org.br)

 [@hospitalfeliciorocho](https://www.instagram.com/hospitalfeliciorocho)

 [/hospitalfeliciorocho](https://www.facebook.com/hospitalfeliciorocho)

 [/hospitalfeliciorocho](https://www.youtube.com/hospitalfeliciorocho)

